

LA PESCA DE LA VIEJA, Sparisoma (Euscarus) cretense (L.),  
CON REDES IZADAS ("PANDORGAS") EN LAS CANARIAS OCCIDENTALES

J.A. GONZALEZ, I.J. LOZANO \* & C.M. HERNANDEZ

Secc. Pesquerías. Centro de Tecnología Pesquera. Cabildo Insular de Gran Canaria. Apdo. 56, 35200 Telde (Las Palmas). España.

\* Departamento de Biología Animal (Ciencias Marinas). Universidad de La Laguna. 38206 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). España.

ABSTRACT: THE FISHING OF THE PARROTFISH, Sparisoma (Euscarus) cretense (L.), WITH LIFT NETS IN THE WESTERN CANARIES. In the present work, this Canarian small-scale fishery is preliminary studied. This kind of lift net and its handling are described, and some fishing and economical parameters are given.

De forma preliminar, se aborda el estudio de la subpesquería de la Vieja, Sparisoma (Euscarus) cretense (L.) (Osteichthyes: Scaridae), por medio de redes izadas, localmente denominadas "pandorgas".

Esta técnica de captura es exclusiva de las Canarias occidentales. Se trata de redes izadas portátiles, manipuladas desde la embarcación y levadas a mano. Los principales elementos auxiliares del arte son: una larga fisga con mango de madera ("fijón") para la captura de erizos de mar que sirven de carnada, un "mirafondos" o artificio para la detección de los peces y un pequeño salabre ("jamo") para retirar los ejemplares de la "pandorga". Las cuatro o seis primeras viejas obtenidas son atravesadas por la región bucal mediante una estaquilla, constituyendo reclamos vivos para la pesca de sus congéneres.

Del trabajo de LA-ROCHE et al. (1983) y de nuestros datos, es posible estimar que, durante 1982, la Vieja fue la especie demersal más pescada en numerosas localidades de Tenerife y La Gomera. El porcentaje de estas capturas atribuible a "pandorgas" fue del 86,5 y 64,4 % para cada isla. Las CPUE medias más elevadas correspondieron a Puerto de la Cruz (42,1), San Marcos (37,1), Garachico (34,7) y Playa de Santiago (13,9 kg de Vieja/jornada de pesca). Desde 1987, los porcentajes de captura de Vieja asignables a "pandorgas" son aún mayores como consecuencia de la casi total prohibición del uso de redes de enmalle y de la regulación del empleo de nasas.

En Playa de Santiago (La Gomera), la pesca de la Vieja con "pandorgas" prácticamente responde a un modelo único en cuanto a especie, arte y comunidad de pescadores. La pesquería es practicada a lo largo del año y de todo el litoral insular. Una flotilla, compuesta por una veintena de pequeñas embarcaciones (no más de ocho practicando permanentemente esta pesquería), obtuvo los parámetros pesqueros y económicos siguientes:

Año	Meses	Captura	Esfuerzo	CPUE media	Millones Pts.
1988	06-12	5541	291	19,04	3,9
1989	01-12	10654	487	21,88	7,5
1990	01-09	6828	272	25,10	4,8