

* Boletín Informativo *

LA PALMA


Nº 157 - Enero-Febrero, 1985

- **Relaciones Culturales protohistóricas de Canarias**
- **La cría del gusano de seda en La Palma**



**LA CAJA
DE CANARIAS**

CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS



▲ SOLDADO

CLASE: Osteichthyes.

ORDEN: Heterosomata (Pleuronectiformes).

SUBORDEN: Pleuronectoidei.

FAMILIA: Soleidae.

GENERO: *Microchirus* Bonaparte, 1.853.

ESPECIE: *Microchirus ocellatus* (Linnaeus, 1.758).

NOMBRES VULGARES: El oficial en español es Tambor real. En Canarias, Cádiz y muchas localidades del Mediterráneo español se conoce como Soldado.

CARACTERES DESCRIPTIVOS: Cuerpo oval, algo alargado. Pedúnculo caudal libre. Borde posterior de aleta caudal redondeado y negruzco. Pectorales pequeñas, siendo la del flanco ciego más corta y presentando el radio superior sencillo y los restantes ramificados. Escamas con espínulas erizadas y desiguales (piel muy áspera al tacto). Coloración típica e inconfundible.

HABITAT: Bentónico. Vive sobre fondos fangosos y arenosos, desde 10 m. hasta 300 m. de profundidad.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: En el Mediterráneo, Mar Adriático y Bósforo. A lo largo de las costas del Atlántico oriental, desde el suroeste de la península Ibérica hasta Mauritania. También en Madeira, Canarias y Annon.

REPRODUCCION: Ovípara. La puesta se efectúa, al menos, en la época invierno-primavera.

ALIMENTACION: Como los restantes Soleidos, debe ser una especie carnívora, eurífaga y micrófaga, alimentándose preferentemente de Invertebrados bentónicos lentos o inmóviles.

LONGITUD MAXIMA: Alcanza tallas no superiores a 16 cm.

COLORACION: Flanco oculado pardo o grisáceo, sobre cuyo fondo destacan cuatro grandes manchas negras ocelladas, colocadas por parejas en la

mitad posterior del cuerpo, precedidas de otras difusas, entre las que sobresale la mayor, situada sobre la línea lateral; aletas dorsal y anal oscuras; pedúnculo caudal atravesado por una mancha negra. Flanco ciego completamente blanco.

CURIOSIDADES: Especie poco abundante. Se captura con artes de arrastre y redes de enmalle.

J.A. GONZALEZ PEREZ

Biólogo del Centro de Tecnología Pesquera

FAUNA CANARIA

PECES

ANJOBA, PEJE REY

CLASE: Osteichthyes (Osteictios).

ORDEN: Percomorphi (Perciformes).

SUBORDEN: Percoidi.

FAMILIA: Pomatomidae.

GENERO: Pomatomus.

ESPECIE: *Pomatomus saltator* (L., 1.766).

CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS: Cuerpo alargado, robusto y algo comprimido lateralmente. Ojos muy pequeños. Dientes fuertes en ambas mandíbulas, vómer, paladar y base de la lengua. Cuerpo con pequeñas escamas. Dos aletas dorsales.

COLORACION: Dorso azul verdoso, flancos plateados, vientre blanco. Aletas con coloración oscura.

HABITAT: Pelágico, gusta de zonas litorales.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Atlántico Oriental desde Portugal a Sudáfrica; Mediterráneo, Mar Negro. Común en Canarias.

REPRODUCCION: Ovípara. Huevos planctónicos. A finales de primavera.

ALIMENTACION: Carnívoro. Muy voraz. Fundamentalmente de otros peces, calamares, y pulpos.

LONGITUD MAXIMA: Llega a medir 1 m. 50 cm., lo común es 0,60 m.

CURIOSIDADES: Se le pesca con trasmallo, palangre de superficie y currica. En la pesca deportiva con caña y lanzado desde orilla y puntera o comedero de metal, dado que es fácil que seccionen el nylon con sus poderosos dientes. Ocurre a menudo que al izar otro pescado éste aparezca partido debido al ataque del Peje Rey. Su carne es muy apreciada. Es la única especie de la familia.

RICARDO CASTILLO EGUÍA

Centro de Tecnología Pesquera

