

CLASE: Peces  
ORDEN: Percomorphi (Perciformes)  
SUBORDEN: Percoidei  
FAMILIA: Labridae  
GENERO: *Xyrichtys*

ESPECIE: *Xyrichtys novacula* (Linnaeus, 1758)

NOMBRES VULGARES: Raó, pez peine, vaca.

HABITAT: Bentónico. Litoral de fondos arenosos limpios de escollos, algas y fanerógamas, desde 1 a 50 metros.

REPRODUCCION: Ovipara. La puesta se realiza en verano. Los huevos son flotantes.

LONGITUD MAXIMA: Unos 30 cm.

ALIMENTACION: Carnívora. Su régimen alimenticio es variado, pero se compone principalmente de crustáceos y moluscos.

COLORACION: El color es rosado, intenso en el dorso y más claro en los flancos, con delgadas bandas transversales de color azulado en la cabeza y parte anteroventral del tronco. En los ejemplares adultos aparecen tonos grisáceo-verdosos en el dorso y algunas manchas amarillentas.


DISTRIBUCION: Se encuentra en el Mediterráneo y en ambas orillas del Atlántico tropical y subtropical. En el Atlántico Oriental se extiende desde el sur de España hasta el Cabo López, incluyendo las islas Azores, Madeira, Canarias y Santa Helena. En Canarias es una especie frecuente.

El raó es característico por su cuerpo muy estrecho que le permite zambullirse rápidamente en la arena y desaparecer en un instante cuando es acosado.

Normalmente se encuentran individuos aislados, pero también es frecuente observar en verano grupos de pocos ejemplares.

La carne es de muy buen sabor pero, como no forman grandes cardúmenes ni alcanzan buena talla, su pesca es ocasional, capturándose algunos en los trasmallos principalmente.

Texto y foto: A. Brito  
Departamento de Biología Marina.  
Universidad de La Laguna.



## FAUNA CANARIA

### PECES

CLASE: Osteichthyes  
ORDEN: Heterosomata (Pleuronectiformes)  
SUBORDEN: Pleuronectoidei  
FAMILIA: Soleidai  
GENERO: *Solea*

ESPECIE: *Solea lascaris* (Risso, 1810)

NOMBRE VULGAR: Lenguado, Pegusa,

Lenguado manchado.

HABITAT: Bentónico. Vive sobre fondos arenosos o fangosos, reposando sobre su flanco izquierdo o "ciego". Especie costera que se distribuye desde 30 hasta 350 m. de profundidad.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Mediterráneo, Adriático, Mar del Norte meridional y Atlántico oriental desde el SW de Gran Bretaña hasta Sudáfrica, incluidas las Islas Canarias.

ABUNDANCIA: Variablemente común, no llegando a formar cardúmenes importantes.

REPRODUCCION: Ovipara. En el NW de África y en Canarias, la época de freza parece coincidir con los meses de enero, febrero, marzo y abril, con un máximo entre finales de febrero y mediados de marzo.

ALIMENTACION: Omnívora. Su variadísima dieta se compone de: Moluscos, Crustáceos, Poliquetos y otros Gusanos, Equidemos, Peces y Celentéreos.

LONGITUD MAXIMA: Alcanza los 40 cm.

COLORACION: Flanco derecho u "ocular": variable según el fondo marino, pudiendo ser canelo, pardo, gris, azulado o negruzco, con manchas más oscuras jaspeadas o simples motas más o menos alineadas longitudinalmente. Aleta pectoral con mancha negra redondeada, bordeada de anaranjado y, en su extremo más distal, de blanco.

Flanco izquierdo o "ciego": color blanquecino, presentando algunas poblaciones la aleta dorsal y la anal oscuras. Aleta pectoral completamente blanca, pero con una mancha negra intensa en algunos ejemplares.

CURIOSIDADES: La clasificación taxonómica de esta especie está actualmente en revisión. Abertura nasal anterior del flanco izquierdo extraordinariamente dilatada en forma de roseta (característica típica del Subgénero Pegusa, para algunos Género).

En Canarias se pesca ocasionalmente con trasmallos y chinchorros, en el Banco Sahariano con redes de arrastre. Su carne es blanca, compacta y de excelente calidad.




Foto: Centro de Tecnología Pesquera  
Texto: J.A. González Pérez (Biólogo)