



INTRODUCCIÓN

MÁS DE 13 AÑOS COMBATIENDO LA DESNUTRICIÓN EN EL CREN DE BASSE

Desde la inauguración en Basse del primer Centro de Recuperación y Educación Nutricional de Gambia se ha implementado una metodología muy valorada por sus buenos resultados. Tras la detección de la **desnutrición infantil**, la madre junto a su hijo/a ingresan en el Centro hasta la re-cuperación nutricional. Además de las madres que acuden por iniciativa propia, se llevan a cabo cribados nutricionales en las comunidades de las regiones a fin de detectar los casos de desnutrición y pro-mover que las madres trasladen a los menores a los CRENS.



Figura 1: Mapa político de Gambia

METODOLOGÍA DEL CREN

ACTIVIDADES DEL CREN

- Screenings: valoración del estado nutricional de los niños/as para detectar los casos de desnutrición.**
- Asistencia a niños/as de 0-59 meses con desnutrición aguda severa. (protocolo de la OMS)**



El baño; disminuir las pérdidas insensibles y educar a las madres a estimular a sus hijos jugando.

RESULTADOS

Coincidiendo con la estancia en Gambia, se informatiza la recogida de datos, y se registran datos de filiación e historia clínica de **128 niños** que cumplían criterios de ingreso desde **junio hasta diciembre de 2021**.




Figura 2, 3 y 4: Datos demográficos

La **desnutrición severa** se diagnostica cuando se registra una pérdida significativa de peso respecto a la talla, o cuando tiene manifestaciones clínicas de enfermedad tipo emaciación y/o edema. La mayoría de los pacientes solo tenían alteraciones en la somatometría (disminución de peso para la talla) sin alteraciones clínicas.



Figura 5: Resultados

CONCLUSIONES

- Los **cribados nutricionales** suponen una herramienta fundamental para la detección de la desnutrición severa, así como para iniciar la asistencia a dichos niños y sus familias.
- El **número de gestaciones maternas** y de **hijos vivos** en el momento del ingreso se ha relacionado con la desnutrición severa. En el 97% de los casos, era el primer hijo que ingresaba por desnutrición y en el 98% de los casos era el menor de la familia.

